

콘택트렌즈세정액

Korea Food & Drug Administration



황사에보가 있는 경우에는 가급적 콘택트렌즈 대신에 안경을 착용하는 것이 좋습니다. 그러나 부득이 안경을 사용할 수 없는 경우에는 렌즈의 세정관리를 철저히 하여 황사로 인한 안질환 및 각막 손상을 예방하는 것이 필수적입니다.

주요 성분

염산폴리헥사메틸렌비구아니드,
글루콘산클로르헥시딘액, 폴록사머407

효능 효과

소프트콘택트렌즈의 단백질 제거,
소프트콘택트렌즈의 세척 하드 및 산소투과성 하드 콘택트렌즈의 세척,
헹굼, 소독, 보존 및 습윤



사용할 때 주의할 점

1. 콘택트렌즈 세정 및 소독을 소홀히 하면 눈의 분비물이나 각종 불순물의 누적으로 인해 세균, 곰팡이 등이 번식하여 안질환을 일으킬 수 있으므로, 매일 콘택트렌즈와 케이스를 깨끗이 씻고 소독하여 위생적으로 보존해야 합니다.
2. 콘택트렌즈의 종류가 다르면 렌즈에 흡착되는 이물질이 달라질 수 있으므로 세정할 때에는 콘택트렌즈의 종류에 맞는 전용세정액을 사용하는 것이 좋습니다.
 - 소프트렌즈는 친수성의 재질로 되어 있어 단백질이 흡착되기 쉬우므로 단백분해효소나 음성전하를 띠는 염 등이 들어가 있는 소프트렌즈 전용 세정액을 사용하여 단백질 제거용이어야 합니다.
 - 하드렌즈는 소수성의 재질로 되어 있어 지질이 흡착되기 쉽기 때문에 계면활성제가 많이 들어가 있는 하드렌즈 전용 세정액을 사용해야 합니다.
3. 특히, 생리식염수는 콘택트렌즈 세정용으로 허가된 것을 사용하고 개봉 후 1주 이상 된 것은 오염의 가능성이 있으므로 사용하지 말아야 하며, 세정액의 오염을 방지하기 위하여 용기의 마개부분을 만지지 말고, 사용하지 않을 때에는 마개를 꼭 닫아 두어야 합니다.

SHOP

안심주고 기쁨주는
식약안전의 첫단추
KIFDA

Korea Food & Drug Administration



KFDA 식품의약품안전청
Korea Food & Drug Administration

안심주고 기쁨주는
식약안전의 첫단추
KIFDA

서울특별시 은평구 통일로 194번지 www.kfda.go.kr
 화장품정책과 | Tel. (02)380-1693~4 Fax. (02)385-7082
 화장품심사과 | Tel. (02)380-1721~2 Fax. (02)385-2154
 화장품연구팀 | Tel. (02)380-1730~1 Fax. (02)385-0046

KFDA 식품의약품안전청
Korea Food & Drug Administration

안심주고 기쁨주는
식약안전의 첫단추
KIFDA

생활속의 의약품! 알고 사용하세요!

- 치아미백제
- 전자식흡연욕구저하제
- 콘택트렌즈세정액



KFDA 식품의약품안전청
Korea Food & Drug Administration

안심주고 기쁨주는
식약안전의 첫단추
KIFDA

서울특별시 은평구 통일로 194번지 www.kfda.go.kr
 화장품정책과 | Tel. (02)380-1693~4 Fax. (02)385-7082
 화장품심사과 | Tel. (02)380-1721~2 Fax. (02)385-2154
 화장품연구팀 | Tel. (02)380-1730~1 Fax. (02)385-0046

KFDA 식품의약품안전청
Korea Food & Drug Administration

치아미백제



치아미백제는 치아를 하얗게 만들어주는 제품으로 과산화수소 성분이 치아에 침투하여, 치아 색을 누렇게 만드는 유기화합물을 분해합니다. 칫솔에 묻혀 사용하는 페이스트제, 치아 표면에 도포하여 사용하는 겔제, 필름형태로 치아에 부착하여 사용하는 첩부제 등과 같이 다양한 타입이 있습니다.

주요 성분

과산화수소수, 카바마이드퍼옥사이드

효능 효과

치아미백



사용할 때 주의할 점

- 1. 치아미백제는 과산화수소를 함유하는 제품으로 과산화수소에 과민증이 있는 사람은 사용하지 말아야 하며, 과산화수소에 의해 잇몸 침샘이나 상처부위에 자극을 주거나 손상을 줄 수 있으므로 치아미백제가 직접 닿지 않도록 조심하여 사용해야 합니다.
- 2. 생활속의 치아미백제는 과산화수소 3%를 넘지 못하도록 제한하고 있어 비교적 안전하나, 과산화수소가 피부에 접촉하는 시간이 길수록 잇몸자극이나 손상 등 부작용이 발생할 가능성이 높아지므로 용법용량에 정해진 시간보다 장기간 사용하지 말아야 합니다.
- 3. 치아미백 후 이가 시린 증상이 나타나거나 잇몸이 붉어지거나 쓰라림이 느껴질 때에는 미백을 중단하고 치과 의사와 상담하여야 합니다. 치아미백제를 사용한 후에는 양치질을 하여 치아미백제가 입안에 남지 않도록 하는 것이 좋습니다.
- 4. 환자의 치아 변색은 질병의 증상일 수도 있으므로 치아미백전에 치과 의사와 상담하는 것이 좋습니다.

전자식 흡연욕구저하제



담배의 흡연욕구를 저하시키거나 충족시키는 효능을 가지며 니코틴이 함유되어 있지 않은 제품을 '의약외품'으로 관리하고 있습니다.

주요 성분

연초유

효능 효과

담배의 흡연욕구를 저하시키거나 충족시킴



사용할 때 주의할 점

- 1. 식품의약품안전청에서 전자흡연욕구저하제로서 의약외품으로 허가를 받은 제품은 니코틴이 함유되어 있지 않습니다.
- 2. 정해진 용법·용량(10일간 하루 한 개피)대로 사용하면 담배에 대한 흡연욕구를 떨어뜨리기 위해 도움을 줄 수 있으나 담배를 대신하여 수개월 이상 계속 사용하는 것은 안전성과 효능에 대한 입증되지 않았으므로 자제하여야 합니다.
- 3. 비흡연자나 18세 미만의 청소년들은 사용하지 말아야 합니다.
- 4. 이 약은 프로펠렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 하여야 합니다.

